



¡AVISO!

PREVENCIÓN PEDICULOSIS CLASE:TODAS

La ducha higiénica diaria y el lavado de cabeza son medidas de higiene básicas.

+ Tenga la costumbre de revisar al menos una vez en semana la cabeza de sus hijos, y siempre que haya alguna alarma de este tipo en el colegio o en su barrio, o le vea rascarse con frecuencia la cabeza.

+ En un cabello bien limpio, peinado y cepillado el piojo encuentra dificultades para asentarse.

+ El pelo corto facilita la higiene del cabello.

+ Hay que advertir a los niños que no deben intercambiarse objetos como peines, cepillos, pasadores y diademas.

+ Una vez detectado el problema de "piojos", el tratamiento individual es muy fácil. Consiste en:

- Usar una loción insecticida, aplicada en el cabello durante un tiempo determinado, poniendo al niño en la cabeza un gorro de plástico. Después enjuagar el pelo, y lavar con un champú insecticida.

- Es necesario revisar concienzudamente el cabello, y retirar las liendres con la ayuda de un peine especial para ello.

- Repetir la operación pasados siete días, ya que el periodo de desarrollo de la liendre es de seis días.

+ El uso continuo de champús y lociones para prevenir la pediculosis está contraindicado por producir resistencia en los parásitos frente al desinfectante.