



¡AVISO!

PREVENCIÓN PEDICULOSIS CLASE: TODAS

La ducha higiénica diaria y el lavado de cabeza son medidas de higiene básicas.

- Tenga costumbre de revisar al menos una vez en semana la cabeza de sus hijos, y siempre que haya alguna alarma de este tipo en el colegio o en su barrio, o le vea rascarse con frecuencia la cabeza.
- En un cabello bien limpio, peinado y cepillado el piojo encuentra dificultades para asentarse.
- El pelo corto facilita la higiene del cabello.
- Hay que advertir a los niños que no deben intercambiarse objetos como peines, cepillos, pasadores y diademas.
- Una vez detectado el problema de “piojos”, el tratamiento individual es muy fácil, Consiste en:
 - Usar una loción insecticida, aplicada en el cabello durante un tiempo determinado, poniendo al niño en la cabeza un gorro de plástico. Después enjuagar el pelo, y lavar con un champú insecticida.
 - Es necesario revisar concienzudamente el cabello, y retirar las liendres con la ayuda de un peine especial para ello.
 - Repetir la operación pasados siete días, ya que el periodo de desarrollo de la liendre es de seis días.
- El uso continuo de champús y lociones para prevenir la pediculosis está contraindicado por producir resistencia en los parásitos frente al desinfectante.